

На рис. 3 показан результат компьютерного моделирования черного обтачивания наружной поверхности вала. В нижнем левом углу находится листинг автоматизировано созданной программы для станка с ЧПУ. Это функция модуля весьма существенна, так как позволяет перейти от обучения технологов к подготовке технологов-программистов.

Вывод.

1. Включение программного продукта КОМПАС 15.1 «Модуль ЧПУ-токарная обработка» в состав читаемых дисциплин для подготовки технологов-машиностроителей позволило повысить качество подготовки студентов.

2. В перспективе возможно углубленное изучение модуля с использованием пользовательских 3D-моделей приспособлений и инструмента, а также алгоритмов программирования станков с ЧПУ. Для этого разработчикам модуля нужно положительно рассмотреть вопрос о выдаче университетам льготных лицензий для образовательных целей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Паньков М. Токарная обработка как начало САМ-истории в АСКОН / М. Паньков // САПР и графика. – 2013. – №7. – С.37 – 43.

2. Сивун С.А. Технологические особенности автоматизированного программирования токарной обработки червяка в среде Компас-3D v15.1 / С.А. Сивун, В.В. Процев, С.Т. Пацера // Сборник научных трудов международной конференции "Развитие информационно-ресурсного обеспечения образования и науки в горно-металлургической отрасли и на транспорте 2014". – Днепропетровск. НГУ, 2014. – С.385–390.

УДК 37.01:007+378

ВИКОРИСТАННЯ MICROSOFT MATHEMATICS ДЛЯ НАВЧАННЯ АНАЛІТИЧНІЙ ГЕОМЕТРІЇ

М.Є. Зюков

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава, Україна, e-mail: mzkv@mail.ru

Анотація. Розглядаються обчислювальні та графічні можливості Microsoft Mathematics для роботи з прямими, площинами та кривими і поверхнями другого порядку. Описуються алгоритми розв'язування основних задач на прямі та площини і приведення рівнянь кривих і поверхонь другого порядку до канонічного вигляду за допомогою Microsoft Mathematics.

Ключові слова: *Microsoft Mathematics, аналітична геометрія, пряма, площина, поверхні другого порядку*



USING MICROSOFT MATHEMATICS FOR TEACHING ANALYTIC GEOMETRY

Mykhaylo Zyukov

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of Mathematics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Ukraine, e-mail: mzkv@mail.ru

Abstract. The computing and graphics capabilities of Microsoft Mathematics for work with straight lines, planes, curves and surfaces of second order are discussed. Algorithms for solving the basic problems on straight lines and planes and transforming the equations of curves and surfaces of second order to the canonical form using Microsoft Mathematics are described.

Keywords: Microsoft Mathematics, analytic geometry, straight line, plane, surfaces of second order.

Вступ. У 2011 р. з'явилася програма Microsoft Mathematics 4.0 [1], яка безкоштовна, російською мовою, має зручний інтерфейс, не вимагає спеціального навчання, а робота з нею нагадує роботу біля дошки або в зошиті. Її можна віднести до систем комп'ютерної алгебри початкового рівня. Обмежена кількість ретельно підібраних команд, їх простий синтаксис і відсутність опцій, є скоріше перевагою цієї програми, бо дозволяє швидко почати працювати з нею. Результати обчислень не можна автоматично повторити з іншим набором вхідних даних. Робочий аркуш MS Mathematics є лише звітом про виконані команди. Його можна зберегти у файлі, переглянути або надрукувати, але не можна повторно виконати. Для розв'язування нової задачі потрібно принаймні редагувати команди робочого аркушу та повторно їх виконати. Все це робить MS Mathematics дуже зручною для використання у навчальному процесі.

Література по даній темі нам не відома. Основи роботи в MS Mathematics описані в огляді [2].

Мета роботи. Покажемо, що інструментів програми MS Mathematics достатньо для розв'язування всіх типових задач стандартного курсу аналітичної геометрії, а її доцільно використовувати для візуалізації та розв'язування задач аналітичної геометрії з великим обсягом розрахунків.

Матеріал і результати дослідження. На вкладці Построение графиков робочого аркуша MS Mathematics можна будувати лінії або поверхні в декартовій, полярній, циліндричній або сферичній системах координат, які задані явно, неявно або параметрично. Відповідна команда відображається на вкладці Лист, а в її області виведення показана копія графіка. Графік можна зберегти як малюнок у файлі відповідного формату. Графіки поверхонь інтерактивні – їх можна повертати з допомогою миші. Можлива анімація

графіків ліній або поверхонь з параметрами в деякому діапазоні їх зміни. Є можливість розв'язувати графічно системи нерівностей з двома змінними на площині.

Для використання аналітичних можливостей MS Mathematics геометричні об'єкти зручно задавати за допомогою векторів і матриць, як це робиться в підручниках [3-4]. Їх аналогами в MS Mathematics є списки та матриці. Список – це набір елементів, розділених комою і взятих у фігурні дужки. Точка задається радіус-вектором, а вектори – як списки координат. Матриця – це прямокутний масив об'єктів, що складається не більше ніж з 15 рядків і стовпців.

Для роботи з векторами є три функції: модуль вектора (magnitude), скалярний (inner) і векторний (cross) добуток. Для матриць набір функцій значно ширший.

У MS Mathematics немає такого об'єкту як рівняння, але рівність із змінними, яким не присвоєні значення, розглядається як рівняння. Після введення такої рівності робиться спроба розв'язати її відносно однієї з невідомих змінних. Якщо це вдається зробити, пропонується розв'язати рівняння відносно інших невідомих змінних. Функція *solve(рівняння, змінна)* повертає розв'язок даного рівняння відносно вказаної змінної. Функція *solve(список_рівнянь, список_змінних)*, де кількість рівнянь дорівнює кількості змінних, повертає розв'язок системи рівнянь відносно вказаних змінних, якщо вони не входять в число збережених на даний момент змінних.

Вважатимемо, що площина або пряма на площині задана рівнянням $(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0$, де \vec{r} і \vec{r}_0 – її поточна та початкова точки, а \vec{n} – нормальний вектор. Якщо площина задається рівнянням $Ax + By + Cz + D = 0$, то $\vec{n} = (A, B, C)$, а \vec{r}_0 – точка перетину площини з однією з осей координат, тобто частинний розв'язок даного рівняння. Теж саме стосується прямої на площині, що задана рівнянням $Ax + By + C = 0$.

Пряма задається рівнянням $[\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}] = 0$, де \vec{a} – напрямний вектор. Для прямої на площині остання координата всіх векторів дорівнює нулю. Якщо пряма задана як лінія перетину двох площин, то її напрямний вектор знаходять функцією *cross* як векторний добуток нормальних векторів даних площин. Його ненульовим координатам відповідають дві базисні невідомі системи рівнянь даних площин. Початкову точку знаходять функцією *solve(список_рівнянь)* як частинний розв'язок цієї системи для вибраного значення небазисної невідомої, додавши його у вигляді рівняння до списку рівнянь площин. Якщо покласти значення небазисної невідомої рівним параметру t , то одержимо параметричні рівняння прямої. Якщо пряма на площині задана рівнянням $Ax + By + C = 0$, то $\vec{a} = (-B, A, 0)$, а якщо рівнянням $y = kx + b$, то $\vec{a} = (1, k, 0)$.

Багато задач на прямі і площини можна розв'язати, користуючись поняттями ортогональної проекції та ортогональної складової одного з двох векторів. Якщо \vec{a} ненульовий вектор і $\vec{a}_0 = \vec{a}/|\vec{a}|$, то $\vec{b}_1 = (\vec{b}, \vec{a}_0)\vec{a}_0$ називається ортогональною векторною проекцією \vec{b} на \vec{a} [3, с. 26]. Тоді $\vec{b}_2 = \vec{b} - \vec{b}_1$ є складовою \vec{b} , що ортогональна \vec{a} . Модуль ортогональної складової \vec{b}_2 чисельно дорівнює площі паралелограма, побудованого на векторах \vec{a}_0 і \vec{b} . Для тривимірних векторів $\vec{b}_2 = [\vec{a}_0, [\vec{b}, \vec{a}_0]]$ і $|\vec{b}_2| = |[\vec{b}, \vec{a}_0]|$.

Точка і площина.

Задано площину $(\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0$ і точку M з радіус-вектором \vec{R} . Напрямним вектором перпендикуляра з точки M на дану площину є нормальний вектор \vec{n} . Тому $[\vec{r} - \vec{R}, \vec{n}] = 0$ рівняння перпендикуляра з точки M на площину. Якщо точка M_1 з радіус-вектором \vec{r}_1 є проекцією точки M на площину, то вектор $\vec{R} - \vec{r}_1$ дорівнює ортогональній проекції вектора $\vec{R} - \vec{r}_0$ на \vec{n} , тобто $\vec{R} - \vec{r}_1 = (\vec{R} - \vec{r}_0, \vec{n}_0)\vec{n}_0$, де $\vec{n}_0 = \vec{n}/|\vec{n}|$. Тоді $\vec{r}_1 = \vec{R} - (\vec{R} - \vec{r}_0, \vec{n}_0)\vec{n}_0$. Відстань від точки M до площини дорівнює модулю вектора $\vec{R} - \vec{r}_1$, тобто $|(\vec{R} - \vec{r}_0, \vec{n}_0)|$. Отже, точка M належить даній площині тоді і тільки тоді, коли $(\vec{R} - \vec{r}_0, \vec{n}) = 0$.

Пряма і площина.

Задано пряму $[\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}] = 0$ і площину $(\vec{r} - \vec{r}_1, \vec{n}) = 0$. Якщо пряма не паралельна площині, тобто $(\vec{a}, \vec{n}) \neq 0$, то знайдемо точку її перетину з площиною. Запишемо рівняння прямої у параметричній формі $\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t$ і підставимо у рівняння площини. Розв'язавши одержане рівняння відносно t і підставивши значення параметра у рівняння прямої, знайдемо радіус-вектор точки перетину прямої з площиною $\vec{R} = \vec{r}_0 + \frac{(\vec{r}_1 - \vec{r}_0, \vec{n})}{(\vec{a}, \vec{n})}\vec{a}$.

Напрямним вектором проекції прямої на площину є складова напрямного вектора прямої $[\vec{n}_0, [\vec{a}, \vec{n}_0]]$, що ортогональна нормальному вектору площини. За початкову точку проекції прямої на площину можна взяти або точку перетину прямої з площиною, або ж проекцію початкової точки прямої на площину.

Точка і пряма.

Задано пряму $[\vec{r} - \vec{r}_0, \vec{a}] = 0$ і точку M з радіус-вектором \vec{R} . Відстань від точки M до прямої дорівнює модулю складової вектора $\vec{R} - \vec{r}_0$, що ортогональна \vec{a} , тобто $[\vec{a}_0, [\vec{R} - \vec{r}_0, \vec{a}_0]]$, де $\vec{a}_0 = \vec{a}/|\vec{a}|$. Напрямним вектором перпендикуляра з точки M на дану пряму є вектор $[\vec{a}_0, [\vec{R} - \vec{r}_0, \vec{a}_0]]$.



ндикюляра з точки M на дану пряму є вектор колінеарний складовій вектора $\vec{R} - \vec{r}_0$, що ортогональна \vec{a} , наприклад вектор $[\vec{a}, [\vec{R} - \vec{r}_0, \vec{a}]]$. Тому $[\vec{r} - \vec{r}_0, [\vec{a}, [\vec{R} - \vec{r}_0, \vec{a}]]] = 0$ є рівнянням перпендикуляра з точки на пряму.

Дві прямі.

Задано прямі $p: [\vec{r} - \vec{r}_1, \vec{a}_1] = 0$ і $q: [\vec{r} - \vec{r}_2, \vec{a}_2] = 0$. Якщо $[\vec{a}_1, \vec{a}_2] = 0$, то прямі паралельні, а відстань між ними дорівнює модулю складової вектора $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$, що ортогональна \vec{a}_1 , тобто $|\vec{a}_{10}, [\vec{r}_2 - \vec{r}_1, \vec{a}_{10}]|$, де $\vec{a}_{10} = \vec{a}_1 / |\vec{a}_1|$. Рівняння площини, що проходить через паралельні прямі, має вигляд $(\vec{r} - \vec{r}_1, \vec{r}_2 - \vec{r}_1, \vec{a}_1) = 0$ і виражає умову компланарності цих векторів.

Якщо прямі p і q не паралельні, то $\vec{n} = [\vec{a}_1, \vec{a}_2]$ нормальний вектор площини P , що проходить через пряму p паралельно q . Тоді відстань між мимобіжними прямими p і q дорівнює відстані початкової точки прямої q до площини P , тобто $|(\vec{r}_2 - \vec{r}_1, \vec{n}_0)|$, де $\vec{n}_0 = \vec{n} / |\vec{n}|$. Отже, дві прямі перетинаються тоді і тільки тоді, коли $(\vec{r}_2 - \vec{r}_1, \vec{a}_1, \vec{a}_2) = 0$. Рівняння площини, що проходить через прямі, що перетинаються, має вигляд $(\vec{r} - \vec{r}_1, \vec{a}_1, \vec{a}_2) = 0$.

Вектор \vec{n} є напрямним вектором спільного перпендикуляра мимобіжних прямих. Тоді площина Q , що проходить через пряму q та спільний перпендикуляр до обох прямих, має рівняння $(\vec{r} - \vec{r}_2, \vec{a}_2, [\vec{a}_1, \vec{a}_2]) = 0$. Початкову точку спільного перпендикуляра можна знайти як точку перетину площини Q та прямої p .

Алгебраїчні поверхні другого порядку.

Алгебраїчні поверхні другого порядку визначаються рівняннями другого степеня відносно декартових прямокутних координат у матричній формі $X^T A X + 2b^T X + c = 0$, де $X = (x, y, z)^T$, $b = (b_1, b_2, b_3)^T$, $A = [a_{ij}]$ ($a_{ij} = a_{ji}$) [4, с. 292]. Це рівняння поворотом і паралельним переносом осей координат можна привести до одного з п'яти рівнянь, залежно від значення рангу r матриці A [4, с. 293]. Якщо $r = 3$, то $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2 + a_0 = 0$, $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \neq 0$, якщо $r = 2$, то $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + 2b_0 z = 0$, $\lambda_1 \lambda_2 b_0 \neq 0$ або $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + c_0 = 0$, $\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$, якщо $r = 1$, то $\lambda_1 x^2 + 2p_0 y = 0$, $\lambda_1 p_0 \neq 0$ або $\lambda_1 x^2 + q_0 = 0$, $\lambda_1 \neq 0$.

Якщо визначити симетричну блокову матрицю $B = \begin{bmatrix} A & b \\ b^T & c \end{bmatrix}$, то коефіцієнти

приведених рівнянь однозначно визначаються загальними інваріантами: $I_1 = \text{tr} A$, $I_3 = \det A$, $K_4 = \det B$ і спеціальними інваріантами: I_2 – сума головних мінорів другого порядку матриці A і K_2, K_3 – суми головних мінорів другого та третього порядків матриці B . У MS Mathematics є функції subMatrix, subBlockMatrix, tr і det для одержання підматриць і обчислення

сліду та визначника квадратної матриці. Числа $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ – корені характеристичного рівняння $\lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0$, $a_0 = K_4 / I_3$, $b_0 = (-K_4 / I_2)^{1/2}$, $c_0 = K_3 / I_2$, $p_0 = (-K_3 / I_1)^{1/2}$, $q_0 = K_2 / I_1$. Залежно від знаків коефіцієнтів приведені рівняння визначаються 17 канонічних рівнянь алгебраїчних поверхонь другого порядку [4, с. 294].

Щоб знайти систему координат, в якій рівняння алгебраїчної поверхні другого порядку має канонічний вигляд, спочатку слід виконати поворот осей координат, тобто перейти до ортонормованого базису e' з власних векторів симетричної матриці A . Власні вектори, що відповідають власному значенню λ , є нетривіальними розв'язками однорідної системи лінійних рівнянь $A_\lambda x = 0$, де $A_\lambda = A - \lambda E$. Їх легко знайти в MS Mathematics, застосувавши функцію reduce до блокової матриці $[A_\lambda | E]$, де E – одинична матриця третього порядку. Одержимо еквівалентну матрицю $[A_{\lambda ref} | S]$, де S – матриця перетворення до східчастої по рядках форми матриці (row echelon form): $SA_\lambda = A_{\lambda ref}$ [5]. Тоді рядки матриці S , що відповідають нульовим рядкам $A_{\lambda ref}$, є власними векторами матриці A . Якщо два власних вектори f_1 і f_2 , що відповідають одному власному значенню, не перпендикулярні, то замість вектора f_2 можна взяти його складову, що ортогональна f_1 . Якщо $r = 1$, то знайдемо як описано вище власний вектор f_1 , що відповідає власному значенню $\lambda_1 \neq 0$. Власні вектори, що відповідають власному значенню $\lambda = 0$, знайдемо за формулами $f_2 = [f_1, b]$, $f_3 = [f_1, f_2]$ [6, с. 262, 7, с. 207].

Якщо стовпцями ортогональної матриці Q є вектори базису e' , то у нових координатах рівняння поверхні другого порядку набуде вигляду $X'^T A' X' + 2b'^T X' + c = 0$, де $A' = Q^T A Q$, $b' = Q^T b$ і матриця A' – діагональна з відповідними власними значеннями матриці A на головній діагоналі.

Якщо після повороту осей рівняння поверхні не набуло приведеного вигляду, то виконаємо паралельне перенесення початку координат в точку $O''(\alpha, \beta, \gamma)$. Тоді у нових координатах рівняння поверхні набуде вигляду $X''^T A' X'' + 2b''^T X'' + c'' = 0$, де $a = (\alpha, \beta, \gamma)^T$, $b'' = b' + A'a$, $c'' = c - a^T b'$.

Щоб позбутися в останньому рівнянні зайвих лінійних членів, треба вибрати координати точки O'' як розв'язок системи лінійних рівнянь $A'a = -b'$. Якщо $r = 3$, то $O''(-b'_1 / \lambda_1, -b'_2 / \lambda_2, -b'_3 / \lambda_3)$. Якщо $r = 2$ і $\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$, то $O''(-b'_1 / \lambda_1, -b'_2 / \lambda_2, 0)$. Якщо $r = 1$ і $\lambda_1 \neq 0$, то $O''(-b'_1 / \lambda_1, 0, 0)$.

Алгебраїчні лінії другого порядку розглядаються аналогічно [4, с. 173].

Висновки. Розглянуті приклади показують, що можливостей MS Mathematics цілком достатньо для розв'язування типових задач аналітичної геометрії. Відсутність автоматизації розгалужених алгоритмів робить роботу

в MS Mathematics схожую на обчислення з калькулятором, лише інтелектуальним. Тому її використання не вимагатиме суттєво змінювати зміст і методику викладання. Цю програму можна успішно застосовувати для навчання лінійній алгебрі, диференціальному та інтегральному численню функцій однієї та кількох змінних.

ЛІТЕРАТУРА

1. Microsoft Download Center. Microsoft Mathematics 4.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=15702>. – Назва з екрану.
2. Зюков М. Е. Обучение высшей математике с использованием Microsoft Mathematics / Зюков М. Е. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки) – 2013, № 20 (279). – С. 67-72. – ISSN 2227-2844.
3. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: Учеб. для вузов / Д. В. Беклемишев. – 11-е изд., испр. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 312 с. – ISBN 5-9221-0691-0.
4. Ильин В. А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Учеб. для вузов / В. А. Ильин, Г. Д. Ким. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. – 320 с. – ISBN 5-211-03814-2.
5. Wolfram Language & System. Documentation Center. RowReduce \ Properties & Relations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reference.wolfram.com/language/ref/RowReduce.html>. – Назва з екрану.
6. Александров П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: Учеб. для вузов / П. С. Александров. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1979. – 512 с.
7. Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. – 13-е изд., исправленное. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 544 с.

УДК 004.5

СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ЭЛЕМЕНТА В ТЕХНОЛОГИИ WPF

Н.В. Карпенко¹, А.А. Доброгорский²

¹кандидат физико-математических наук, доцент кафедры электронных вычислительных машин, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск, Украина, e-mail: karpenko_nadija@mail.ru

²студент группы KI-12У-1, кафедра электронных вычислительных машин, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск, Украина, e-mail: zore3x@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены различные варианты создания пользовательского элемента управления (кнопки-образа) с использованием технологии Windows Presentation Foundation.

Ключевые слова: WPF, интерфейс, пользовательский элемент, styles, templates.